



TAKHZYRO®

INSTRUCCIONES DE USO COMPLETAS

Una guía paso a paso para el uso de la jeringa precargada TAKHZYRO®

TAKHZYRO® es un medicamento que se usa en adultos y adolescentes de 12 años o más con AEH para prevenir ataques de angioedema.

AEH= angioedema hereditario

 **ingresar**

TAKHZYRO® ▼
lanadelumab, inyección subcutánea



ANTES DE COMENZAR

Utilice este folleto para instruir al paciente de todos los pasos para inyectarse correctamente TAKHZYRO®.

Asegúrese de que el paciente comprenda las instrucciones para que pueda aprovechar al máximo su tratamiento.

La inyección puede ser autoadministrada o administrada por un médico, pero el médico, o enfermero debe mostrarle al paciente cómo preparar e inyectar TAKHZYRO® correctamente antes de usarlo por primera vez.


El paciente no debe autoinyectarse, el cuidador no debe inyectar a otra persona hasta que haya recibido entrenamiento.



JERINGA PRECARGADA TOTALMENTE LISTA

La jeringa precargada TAKHZYRO® está lista para autoinyectarse de forma subcutánea.


Las partes de la jeringa TAKHZYRO® son:




Otros elementos necesarios:



Paño
embebido
en alcohol



Algodón/
gasa



Venda
adhesiva



Recipiente
para objetos
punzantes

Importante:

Siempre mantener el recipiente para objetos punzantes
lejos del alcance de los niños




PREPARAR LA INYECCIÓN

1. Reunir un paño con alcohol, algodón o una gasa, una venda adhesiva y un recipiente para desechar objetos punzantes y colocarlos sobre una superficie limpia y plana en un área bien iluminada. Estos suministros no están incluidos en el kit de TAKHZYRO®.
2. Retirar el medicamento de la heladera, abrir la caja, y sacar la jeringa precargada de TAKHZYRO® de la bandeja.
 - **No** utilizar la jeringa precargada de TAKHZYRO® si el sello de seguridad está dañado o abierto
 - Antes de preparar la inyección, dejar que la jeringa precargada esté a temperatura ambiente, por lo menos 15 a 30 minutos
 - El medicamento es sensible a las altas temperaturas. **No** usar fuentes de calor externas, como agua caliente, para calentar la jeringa precargada de TAKHZYRO®
 - **No** remover el capuchón de la aguja hasta que este listo para inyectarse
3. Lavarse las manos con agua y jabón. Secarse las manos completamente.



4. Chequear la fecha de vencimiento en la etiqueta.
- **No** utilizar la jeringa precargada de TAKHZYRO® si está vencida.



5. Inspeccionar visualmente la jeringa precargada de TAKHZYRO® en busca de daños, y asegurarse de que el medicamento sea incoloro o ligeramente amarillo.
- **No** utilizar el producto si la jeringa está dañada (por ej, quebrada)
 - **No** administrar la medicación si está descolorida, turbia o tiene escamas o partículas. Si nota esto, el paciente debe llamar a su profesional de la salud.
 - Es posible que vea burbujas de aire en la jeringa precargada de TAKHZYRO®. Esto es normal y no afectará la dosis.



Como almacenar TAKHZYRO®


- Guardar TAKHZYRO® en la heladera a una temperatura de entre 2°C y 8°C. No congelar. Una jeringa precargada extraída de la heladera debe almacenarse por debajo de 25°C y usarse dentro de los 14 días o volver a ponerla en la heladera hasta su uso.
- Guardar TAKHZYRO® en el envase original para proteger la jeringa precargada de la luz.
- **No** agitar la medicación TAKHZYRO®
- Mantener TAKHZYRO® y todos los medicamentos alejados del alcance de los niños



SELECCIONAR Y LIMPIAR EL SITIO DE INYECCIÓN

1. La jeringa precargada de TAKHZYRO® debe inyectarse en el abdomen, el muslo o la parte posterior del brazo (no se recomienda el área externa de la parte superior del brazo si es una autoinyección).

- Es importante rotar los sitios de inyección para mantener la piel sana. Cada nueva inyección debe administrarse a una distancia mínima de 3 cm del último sitio utilizado.
- **No** inyectarse en un área donde la piel esté irritada, enrojecida, golpeada o infectada.
- El área que elija para la inyección debe estar al menos a 5 cm de cualquier cicatriz o del ombligo.




2. Limpiar el lugar de la inyección con un paño embebido con alcohol y dejar que se seque.

- **No** ventilar o soplar el sitio limpio
- **No** volver a tocar esta área antes de aplicar la inyección.



3. Retirar el capuchón de la aguja de la jeringa precargada de TAKHZYRO®. Tirar suavemente del capuchón de la aguja hacia afuera con una mano, mientras se sujeta firmemente el centro de la jeringa precargada de TAKHZYRO® con la otra mano. Desechar el capuchón de la aguja.

- **No** volver a poner el capuchón en la jeringa precargada de TAKHZYRO®
- **No** utilizar la jeringa precargada de TAKHZYRO® si se cayó sin el capuchón o si la aguja parece dañada o doblada
- **No** tocar la aguja o que la aguja toque nada



INYECTAR TAKHZYRO®

1. Tomar la jeringa precargada de TAKHZYRO® con una mano como si fuese un lápiz . Evitar tocar la aguja o presionar el émbolo.
2. Con la otra mano, pellizcar suavemente un pliegue de 3 cm de piel en el sitio de inyección limpio.
3. Con un movimiento rápido, presionar la aguja dentro de la piel hasta el fondo. Asegurarse de que la aguja quede en su sitio.
4. Lentamente presionar el émbolo hasta que todo el líquido sea inyectado y la jeringa esté vacía. Luego lentamente soltar la piel.
5. Lentamente sacar la aguja mientras se sostiene la jeringa en el mismo ángulo.
6. Presionar el algodón o la gasa sobre el sitio de inyección, de ser necesario mantener ahí durante 10 segundos.
 - **No** frotar el lugar de la inyección. Es posible que tenga un sangrado menor. Esto es normal
 - Poner una venda adhesiva sobre el sitio de inyección, de ser necesario
7. Desechar la jeringa precargada de TAKHZYRO®.
 - **No** tocar la aguja
 - Para evitar lastimarse con la aguja, **no** volver a colocar el capuchón
 - Desechar la jeringa precargada de TAKHZYRO® en un recipiente de objetos punzantes inmediatamente luego de usarla
 - **No** reutilizar la jeringa precargada de TAKHZYRO® o cualquiera de los elementos del kit.



Como cualquier otro medicamento, éste puede causar efectos adversos, aunque no todos puedan experimentarlos.

Si el paciente tiene una reacción alérgica grave a TAKHZYRO®, con síntomas como sarpullido, opresión en el pecho, sibilancias o latidos cardíacos acelerados, debe informar a su profesional de la salud de inmediato.

Informar al médico, farmacéutico o enfermero si nota alguno de los siguientes efectos adversos:

- Reacciones en el sitio de inyección—los síntomas incluyen dolor, enrojecimiento de la piel, hematomas, molestias, hinchazón, sangrado, prurito, endurecimiento de la piel, hormigueo, calor y erupción cutánea (muy frecuentes, pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)
- Reacciones alérgicas que incluyen prurito, malestar y hormigueo en la lengua (frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Mareos, sensación de desmayo
- Erupción cutánea
- Dolor muscular
- Análisis de sangre que muestran cambios hepáticos



▼ Notificación de sospechas de Reacciones Adversas

Es importante reportar sospechas de reacciones adversas al medicamento después de la autorización, ya que permite un control continuado de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Para consultas o para reportar sospechas de reacciones adversas, comunicarse a nuestra línea de atención telefónica gratuita 0800 266 5287 o a través del sistema nacional de notificación en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a "ANMAT responde" 0800-333-1234.

Para saber más sobre el AEH visite: <https://www.conoceah.com>

Para saber más sobre Takhzyro visite: <https://www.takedapro.com/es-ar/>

Takeda respeta la decisión de prescripción del médico.

TAKHZYRO 
lanadelumab, inyección subcutánea
REPENSAR LA PREVENCIÓN



Takeda Argentina S.A.
Av. del Libertador 7208 – Piso 14 - C1429BMR - Buenos Aires, Argentina.
Línea de atención al paciente: 0800 266 5287
Material exclusivo para profesionales de la salud.
Prohibida su distribución al público en general.

C-APROM/AR/TAKH/0215-ABR24-v1.0

